



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
w POZNANIU
Oddział w Wągrowcu**

ul. Gnieźnieńska 57, 62-100 Wągrowiec

tel. / fax(67) 26-25-227

www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin.wagrowiec@poczta.fm

KOMUNIKAT

Zwalczanie parcha jabłoni

Szczegóły:

W związku z zagrożeniem wystąpienia chorób grzybowych zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko parchowi jabłoni. Okresami największego zagrożenia ze strony patogena są faza różowego pąka i kwitnienia jabłoni.

Zalecenia:

Zapobiegając wystąpieniu parcha na jabłoni ochronę należy rozpocząć już od fazy pęknięcia pąków i rozwijania się pierwszych liści. Pierwsze i drugie opryskiwanie należy wykonać środkami miedziowymi, dodynowymi lub ditiokarbaminianami. Listę **przykładowych** środków do ochrony przed parchem jabłoni zamieszczono w poniższej tabeli:

Środki ochrony roślin:

ALTIMA 500 SC * (w obrocie do 23.09.2009 r.) ANTRACOL 70 WG ARDENT 500 SC * BAYCOR 25 WP BUMPER 250 EC CAPITAN 400 EC CAPTAN 50 WP CAPTAN 80 WG CARPENE 65 WP CHAMPION 50 WP ** CHORUS 75 WG CLARINET 200 SC CUPROFLOW 375 SC ** CUPROXAT 345 SC ** DELAN 700 WG * DIFO 250 EC DISCUS 500 WG * (w obrocie do 22.05.2009 r.) DISCUS TOP 675 WG * DITHANE 455 SC * (w obrocie do 23.09.2008 r.) DITHANE M-45, 80 WP * (w obrocie do 10.06.2008 r.) DITHANE NEOTEC 75 WG * DOMARK 100 EC	EFUZIN 500 SC FOLPAN 80 WG FUNGURAN-OH 50 WP ** FUNGURAN EASY 50 WP ** INDOFIL 80 WP * KAPTAN PLUS 71,5 WP KAPTAN ZAW. 50 WP KOCIDE 101 WP ** MAG 50 WP ** MAGIC CAP 45 WP ** (w obrocie do 31.03.2009 r.) MANCONEX 80 WP * MERPAN 50 WP MERPAN 80 WG MIEDZIAN 50 WG ** MIEDZIAN 50 WP ** (w obrocie do 21.11.2008 r.) MIEDZIAN EXTRA 350 SC ** (w obrocie do 14.05.2009 r.) MYTHOS 300 SC NORDOX 75 WG ** NOVOZIR MN 80 WP * (w obrocie do 23.07.2008 r.) PALISADE 25 WP PENNCOZEB 80 WP * (w obrocie do 20.07.2008 r.) PENNCOZEB 455 SC * (w obrocie do 20.07.2008 r.)	PENNFLUID 420 SC POLYRAM 70 WG POMARSOL FORTE 80 WG (w obrocie do 19.09.2008 r.) PUNCH BIS 400 EC (w obrocie do 10.09.2009 r.) RUBIGAN 12 EC * (w obrocie do 17.01.2009 r.) SADOPLON 75 WP SANCOZEB 80 WP * SCORE 250 EC SHAVIT F 71,5 WP SYLLIT 65 WP SYSTEMIK 125 SL SYSTHANE 125 EC (w obrocie do 23.09.2008 r.) TALENT 240 EC THIRAM GRANUFLO 80 WG TOPSIN M 70 WP TRIFMINE 30 WP VECTRA 100 SC (w obrocie do 28.07.2009 r.) VENTOP 350 SC * VISION 250 SC VONDOZEB 75 WG * (w obrocie do 20.07.2008 r.) ZATO 50 WG *
--	---	---

Uwagi:

1. Preparaty oznaczone (*) można stosować przez cały sezon wegetacyjny.
2. Preparaty miedziowe oznaczone (**) stosować **nie później** niż do fazy zielonego pąka (CUPROFLOW 375 SC, NORDOX 75 WG do fazy różowego pąka), ze względu na możliwość wywołania poparzeń.
3. **Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin** znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

4. **W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki** i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin
5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].