



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA  
w POZNANIU  
Oddział w Wągrowcu**

PIORIN

ul. Gnieźnieńska 57, 62-100 Wągrowiec

tel. / fax(67) 26-25-227

[www.piorin.gov.pl/poznan](http://www.piorin.gov.pl/poznan), e-mail: [wiiorin.wagrowiec@poczta.fm](mailto:wiiorin.wagrowiec@poczta.fm)

OWA-5122-14/08

Wągrowiec, dnia 15 maja 2008 roku

**KOMUNIKAT**

**Dotyczący : Zwalczania: czerni krzyżowych , zgnilizny twardzikowej i szare pleśni w rzepaku ozimym**

**Szczegóły:**

Plantacjom rzepaku ozimego zagrażają choroby grzybowe tj. czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa oraz szara pleśń.

**Zalecenia:**

Zabiegi należy wykonywać od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych, a w przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych termin zabiegu można opóźnić do fazy wykształcania pierwszych łuszczyń rzepaku (4-8 łuszczyń na roślinie). Aby zapobiec stratom plonu zaleca się przystąpić do wykonania zabiegu - zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Listę **przykładowych** środków zamieszczono w poniższej tabeli:

**Środki ochrony roślin:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| AMISTAR 250 SC *<br>ATAK 450 EC<br>(w obrocie do 26.09.2008 r.)<br>BRASIFUN 250 EC<br>CARAMBA 60 SL<br>EMINENT STAR 312 SE<br>FUKARB 500 SC *<br>(w obrocie do 31.07.2008 r.)<br>HORIZON 250 EW<br>IMPACT 125 SC<br>KONKER 415 SC<br>(w obrocie do 30.10.2008 r.) | MIRAGE 450 EC<br>(w obrocie do 31.07.2008 r.)<br>ORIOUS 250 EW<br>PROKARB 380 EC<br>PROLINE 250 EC<br>(w obrocie do 30.06.2009 r.)<br>ProRok 450 EC<br>RIZA 250 EW *<br>ROVRAL FLO 255 SC<br>SARFUN 500 SC *<br>SPARTA 250 EW * | SPORTAK ALPHA 380 EC<br>(w obrocie do 31.07.2008 r.)<br>SPORTAK 450 EC<br>STOPER 500 SC<br>(w obrocie do 30.08.2008 r.)<br>SUMI-PRO 500 SC<br>(w obrocie do 31.07.2008 r.)<br>TEBU 250 EW<br>TOPSIN M 70 WP *<br>TOPSIN M 500 SC *<br>TRAPER 250 EC |
|---|---|---|

**Uwagi:**

1. Ww. środki zwalczają także zgniliznę twardzikową (z wyj. oznaczonych \*) oraz szarą pleśń.
2. Środek Sumi-Pro 500 SC stosować w mieszaninie z fungicydem Topsin M 500 SC.
3. Stosowanie preparatów triazolowych wpływa na usztywnienie łodyg przez co zmniejsza się ryzyko wylegania.
4. **Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin** znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
5. **W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki** i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl)>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin
6. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].